

Komplexní analýza

Elementární funkce


Zdeněk Mihula

Katedra matematiky
FEL ČVUT v Praze
mihulzde@fel.cvut.cz

Exponenciálá

Definice

Komplexní funkce $e^z = e^x(\cos y + i \sin y)$, $z = x + iy \in \mathbb{C}$, se nazývá **exponenciální funkce** (krátce **exponenciálá**).



MoneyBART (2010)



- Eulerův vzorec:
 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$, $\varphi \in \mathbb{R}$
- Eulerova identita:
 $e^{i\pi} + 1 = 0$



Tvrzení

Pro všechna $z, w \in \mathbb{C}$ platí

- ① $e^{z+w} = e^z e^w;$
- ② $|e^z| = e^x$, kde $x = \operatorname{Re} z;$
- ③ $e^z \neq 0;$
- ④ $e^{-z} = \frac{1}{e^z};$
- ⑤ Pro $n \in \mathbb{Z}$ platí $(e^z)^n = e^{nz};$
- ⑥ $\overline{e^z} = e^{\bar{z}};$
- ⑦ $e^z = e^w$ právě tehdy, když $w = z + 2k\pi i$ pro nějaké $k \in \mathbb{Z}.$

Důkaz: Viz cvičení. ■

Upozornění

Na rozdíl od reálného oboru je komplexní exponenciála periodická!

Tvrzení

Exponenciála je celistvá funkce a platí $(e^z)' = e^z$ pro každé $z \in \mathbb{C}.$

Důkaz: Viz přednáška. ■

Goniometrické funkce

- Z Eulerova vzorce pro $x \in \mathbb{R}$ plyne


$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}.$$

- Tím je motivována definice goniometrických funkcí v komplexním oboru.

Definice

Komplexní funkce $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$, $z \in \mathbb{C}$, se nazývá **sinus**.

Komplexní funkce $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$, $z \in \mathbb{C}$, se nazývá **kosinus**.



Tvrzení

- $\sin z = 0$ právě tehdy, když $z = k\pi$ pro nějaké $k \in \mathbb{Z}$.
- $\cos z = 0$ právě tehdy, když $z = \frac{\pi}{2} + k\pi$ pro nějaké $k \in \mathbb{Z}$.
- $(\sin z)' = \cos z$ a $(\cos z)' = -\sin z$ pro každé $z \in \mathbb{C}$.

Důkaz: Viz přednáška. ■

- Platí analogické identity jako v reálném případě ($\sin^2 z + \cos^2 z = 1$, součtové vzorce, ...).
- Obdobně jako v reálném případě můžeme definovat funkce **tangens** a **kotangens**:

$$\operatorname{tg} z = \frac{\sin z}{\cos z}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z} \right\};$$

$$\operatorname{cotg} z = \frac{\cos z}{\sin z}, \quad z \in \mathbb{C} \setminus \{k\pi : k \in \mathbb{Z}\}.$$

Definice

- **Hyperbolický sinus** je funkce definovaná vztahem
 $\sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$, $z \in \mathbb{C}$.

- **Hyperbolický kosinus** je funkce definovaná vztahem
 $\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}$, $z \in \mathbb{C}$.

- Pro všechna $z \in \mathbb{C}$ platí $(\sinh z)' = \cosh z$ a $(\cosh z)' = \sinh z$.
- Vztahy mezi hyperbolickými a goniometrickými funkcemi (tzv. Osbornova pravidla):

$$\cos(iz) = \cosh z \quad \text{pro každé } z \in \mathbb{C};$$

$$\sin(iz) = i \sinh z \quad \text{pro každé } z \in \mathbb{C}.$$

Logaritmus

Příklad

Nechť $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$. Komplexní číslo w je řešením rovnice $e^w = z$ právě tehdy, když $w = \ln|z| + i\varphi$ pro $\varphi \in \text{Arg } z$.

Definice


Nechť $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$.

- Komplexní funkci $\ln z = \ln|z| + i \arg z$ nazýváme **hlavní hodnotou logaritmu**.
- Množinu $\text{Ln } z = \{\ln z + 2k\pi i : k \in \mathbb{Z}\}$ nazýváme **mnohoznačný logaritmus**.
- Nebude-li hrozit nedorozumění, budeme občas říkat „logaritmus“ místo hlavní hodnoty logaritmu.
- Přiřazení $z \mapsto \text{Ln } z$, $z \neq 0$, je tzv. „mnohoznačná funkce“.

Příklad

$$\ln(1) = 0, \ln(-1) = i\pi, \ln(i) = i\frac{\pi}{2}.$$

- Komplexní funkce \ln není spojitá v žádném bodě množiny $\{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \leq 0, \operatorname{Im} z = 0\}$.



Tvrzení

Komplexní funkce $\ln z$ je holomorfní na

$$\Omega = \mathbb{C} \setminus \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z \leq 0, \operatorname{Im} z = 0\}$$

a pro každé $z \in \Omega$ platí $(\ln z)' = \frac{1}{z}$.

Důkaz: Viz přednáška. ■

Upozornění

Obecně **neplatí** $\ln(zw) = \ln z + \ln w$.

Příklad

Pro $z = w = e^{i\frac{3}{4}\pi}$ je $\ln(zw) = -\frac{i\pi}{2} \neq \frac{3i\pi}{2} = \ln z + \ln w$.

- Obecně platí pouze $\text{Ln}(zw) = \text{Ln } z + \text{Ln } w$.

Upozornění

Platí $e^{\ln z} = z$ pro každé $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, ale obecně **neplatí** $\ln e^z = z$.

Příklad

$$\ln(e^{2\pi i}) = 0 \neq 2\pi i.$$

- Obecně platí pouze: je-li $z \neq 0$, $\text{Im } z \in (-\pi, \pi]$, pak $\ln e^z = z$.