

# Matematická analýza 2

## Extrémy funkcí

Martin Bohata

Katedra matematiky  
FEL ČVUT v Praze  
martin.bohata@fel.cvut.cz

# Minimum a maximum funkce

## Definice (Minimum a maximum funkce)

Ať  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  a  $M \subseteq D$ . Řekneme, že  $\mathbf{a} \in M$  je **bod minima** (resp. **bod maxima**) **funkce  $f$  na  $M$** , jestliže pro každé  $\mathbf{x} \in M$  je  $f(\mathbf{a}) \leq f(\mathbf{x})$  (resp.  $f(\mathbf{a}) \geq f(\mathbf{x})$ ). Je-li  $\mathbf{a} \in M$  bod minima (resp. maxima)  $f$  na  $M$ , pak hodnotu  $f(\mathbf{a})$  nazýváme **minimem** (resp. **maximem**) **funkce  $f$  na  $M$** .

Poznámka:

- $\mathbf{a}$  je bod maxima  $f$  na  $M$  právě tehdy, když  $\mathbf{a}$  je bod minima  $-f$  na  $M$ .

Terminologie a značení:

- **bod extrému funkce  $f$  na  $M$**  ... bod minima nebo bod maxima.
- **extrém funkce  $f$  na  $M$**  ... minimum nebo maximum funkce  $f$  na  $M$ .
- $\min_{\mathbf{x} \in M} f(\mathbf{x})$  ... minimum funkce  $f$  na  $M$ .
- $\max_{\mathbf{x} \in M} f(\mathbf{x})$  ... maximum funkce  $f$  na  $M$ .
- Ve všech výše uvedených pojmech často vynecháváme „na  $M$ “, jestliže  $M = D$ .

# Minimum a maximum funkce

## Příklad

At'  $f(x) = \|x\|$ .

- 1 existuje právě jeden bod minima  $f$  (na  $\mathbb{R}^n$ ) a neexistuje žádný bod maxima  $f$  (na  $\mathbb{R}^n$ ).
- 2  $f$  má v každém bodě  $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$  minimum a také maximum na  $M$ .
- 3  $f$  nemá v žádném bodě  $M = \{x \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|x\|\}$  minimum ani maximum na  $M$ .

## Příklad

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in (0, 1], \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

Funkce  $f$  nemá bod minima.

# Existence bodu extrému funkce

## Definice (kompaktní množina)

Množina  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  se nazve **kompaktní**, jestliže je omezená a uzavřená.

## Věta (spojitý obraz kompaktu)

*Jestliže funkce  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  je spojitá na kompaktní množině  $M \subseteq D$ , potom  $f(M) = \{f(x) \mid x \in M\}$  je kompaktní množina.*

Důkaz: Viz přednáška. ■

## Věta (Weierstrassova věta)

*Jestliže funkce  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  je spojitá na neprázdné kompaktní množině  $M \subseteq D$ , potom existuje bod minima a také bod maxima  $f$  na  $M$ .*

Důkaz: Viz přednáška. ■

# Lokální extrémy

## Definice (body lokálního extrému)

Ať  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  a  $M \subseteq D$ . Řekneme, že  $\mathbf{a} \in M$  je **bod lokálního minima** (resp. **maxima**) **funkce  $f$  na  $M$** , jestliže existuje okolí  $U(\mathbf{a})$  tak, že  $\mathbf{a}$  je bod minima (resp. maxima)  $f$  na  $M \cap U(\mathbf{a})$ ;

Terminologie:

- **bod lokálního extrému funkce  $f$  na  $M$**  ... bod lokálního minima nebo bod lokálního maxima.

## Definice (stacionární bod)

Ať funkce  $f$  je třídy  $C^1$  na nějakém okolí bodu  $\mathbf{a}$ . Řekneme, že  $\mathbf{a}$  je **stacionární bod funkce  $f$** , jestliže  $\nabla f(\mathbf{a}) = \mathbf{0}$ .

## Věta (Fermatova věta)

*At'  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ ,  $f \in C^1(\Omega)$  a  $M \subseteq \Omega$ . Jestliže  $a \in \text{int}(M)$  je bod lokálního extrému  $f$  na  $M$ , pak  $a$  je stacionární bod funkce  $f$ .*

Důkaz: Viz přednáška. ■

- Fermatova věta dává podmínku nutnou nikoli postačující.
- Jestliže stacionární bod funkce  $f$  není bodem lokálního extrému, pak ho nazýváme **sedlovým bodem funkce  $f$** .

## Příklad

Bod  $(0, 0)$  je sedlový bod funkce  $f(x, y) = x^2 - y^2$ .

# Střípky z lineární algebry

Značení:

- $M_{m,n}(\mathbb{R})$  ... množina všech  $m \times n$  reálných matic.
- $M_n(\mathbb{R})$  ... množina všech  $n \times n$  reálných matic.

Ať  $Q \in M_n(\mathbb{R})$ .

- Nenulový vektor  $v \in \mathbb{R}^n$  nazýváme **vlastní vektor matice  $Q$** , existuje-li  $\lambda \in \mathbb{R}$  tak, že  $Qv = \lambda v$ . Číslo  $\lambda$  se nazývá **vlastní číslo matice  $Q$** .
- Řekneme, že  $Q$  je symetrická, jestliže  $Q^T = Q$ .
- Je-li  $Q$  symetrická, pak všechna její vlastní čísla jsou reálná a existuje ortonormální báze v  $\mathbb{R}^n$  tvořená vlastními vektory matice  $Q$ .

## Definice (definitnost matice)

Ať  $Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$  je symetrická. Řekneme, že  $Q$  je

- 1 **pozitivně** (resp. **negativně**) **definitní**, jestliže pro každé  $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$  je  $Qx \cdot x > 0$  (resp.  $Qx \cdot x < 0$ );
  - 2 **pozitivně** (resp. **negativně**) **semidefinitní**, jestliže pro každé  $x \in \mathbb{R}^n$  je  $Qx \cdot x \geq 0$  (resp.  $Qx \cdot x \leq 0$ );
  - 3 **indefinitní**, jestliže  $Q$  není pozitivně semidefinitní ani negativně semidefinitní.
- $Q$  je negativně definitní (resp. semidefinitní) právě tehdy, když  $-Q$  je pozitivně definitní (resp. semidefinitní).

# Střípky z lineární algebry

- $Q$  je pozitivně (resp. negativně) definitní právě tehdy, když má všechna vlastní čísla kladná (resp. záporná).
- $Q$  je pozitivně (resp. negativně) semidefinitní právě tehdy, když má všechna vlastní čísla nezáporná (resp. nekladná).

## Příklad

1  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  je pozitivně definitní.

2  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$  je pozitivně semidefinitní.

3  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$  je indefinitní.

## Věta (podmínky optimality druhého řádu)

*Ať  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  je otevřená,  $f \in C^2(\Omega)$  a  $\mathbf{a} \in \Omega$  je stacionární bod funkce  $f$ .*

- 1 Je-li  $\mathbf{a}$  bod lokálního minima funkce  $f$ , potom  $\mathbf{H}_f(\mathbf{a})$  je pozitivně semidefinitní.*
- 2 Je-li  $\mathbf{H}_f(\mathbf{a})$  je pozitivně definitní, potom  $\mathbf{a}$  je bod lokálního minima.*
- 3 Je-li  $\mathbf{H}_f(\mathbf{a})$  indefinitní, potom  $\mathbf{a}$  je sedlový bod funkce  $f$ .*

Důkaz: Vynecháváme. ■

- Je-li  $\mathbf{H}_f(\mathbf{a})$  pozitivně semidefinitní, pak  $\mathbf{a}$  nemusí být bod lokálního minima (viz  $f(x) = x^3$ ).

# Lokální extrémy a Hessova matice

## Příklad

Je dána funkce  $f(x, y) = x^3 - xy + y^2$ . Stacionární body jsou

- $(0, 0)$  ... sedlový bod;
- $\frac{1}{12}(2, 1)$  ... bod lokálního minima.

Předpokládejme, že  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$  a  $Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ . Symbolem  $Q_I$  označíme matici, která vznikne z  $Q$  vynecháním všech řádků a všech sloupců indexovaných prvky z množiny  $\{1, \dots, n\} \setminus I$ .

## Příklad

Ať  $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ . Potom  $Q_{\{1,2,3\}} = Q$ ,  $Q_{\{1,3\}} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ -3 & 0 \end{pmatrix}$  a  $Q_{\{2\}} = (-1)$ .

# Lokální extrémy a Hessova matice

## Věta (Sylvesterovo kritérium)

At'  $Q \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$  je symetrická.

- 1  $Q$  je pozitivně definitní právě tehdy, když pro každé  $k \in \{1, \dots, n\}$  je  $\det Q_{I_k} > 0$ , kde  $I_k = \{1, \dots, k\}$ .
- 2  $Q$  je pozitivně semidefinitní právě tehdy, když  $\det Q_I \geq 0$  pro každou neprázdnou množinu  $I \subseteq \{1, \dots, n\}$ .

Důkaz: Vynecháváme. ■

## Příklad

Je dána funkce

$$f(x, y, z) = \frac{1}{x} + y^2 + \frac{1}{z} + xz.$$

Její jediný stacionární bod je  $(1, 0, 1)$ . Jedná se o bod lokálního minima.

## Příklad

Hledejme body extrémů funkce

$$f(x, y) = x^2y - x - y$$

na

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 3\}.$$

- Body minima  $f$  na  $M$  jsou  $(3, 0)$  a  $(0, 3)$ .
- Bod maxima  $f$  na  $M$  je jediný, a to bod  $(2, 1)$ .

# Konvexní množina

## Definice (konvexní množina)

Množina  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  se nazve **konvexní**, jestliže pro každé  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$  je  $\text{seg}(\mathbf{x}; \mathbf{y}) \subseteq C$ .

## Příklad

- 1  $\mathbb{R}^n$  a  $\emptyset$  jsou konvexní množiny.
- 2 Intervaly v  $\mathbb{R}$  jsou konvexní množiny.
- 3 Je-li  $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{R})$  a  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ , pak

$$M = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$$

je konvexní množina.

- 4 Ať  $r > 0$  a  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ . Pak  $U(\mathbf{a}; r)$  a  $B(\mathbf{a}; r) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x}\| \leq r\}$  jsou konvexní množiny.

# Konvexní funkce

## Definice (konvexní funkce)

Ať  $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  a  $C \subseteq D$  je neprázdná konvexní množina. Řekneme, že  $f$  je **konvexní na  $C$** , jestliže pro všechny  $\lambda \in [0, 1]$  a  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in C$  je

$$f(\lambda \mathbf{x} + (1 - \lambda) \mathbf{y}) \leq \lambda f(\mathbf{x}) + (1 - \lambda) f(\mathbf{y}).$$

- Je-li  $f$  konvexní na svém definičním oboru, pak krátce říkáme, že  $f$  je konvexní.
- Funkce  $f$  se nazývá **konkávní na  $C$** , jestliže  $-f$  je konvexní na  $C$ .

## Příklad

Ať  $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ . Funkce  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot \mathbf{c}$  je konvexní.

# Konvexní funkce

## Věta (body minima konvexní funkce)

*Jestliže reálná funkce  $f$  je konvexní funkce na  $C$ , potom každý bod lokálního minima  $f$  na  $C$  je bodem minima  $f$  na  $C$ .*

Důkaz: Viz přednáška. ■

## Věta (konvexnost a Hessova matice)

*Nechť  $f$  je reálná funkce třídy  $C^2$  na otevřené konvexní množině  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ . Potom  $f$  je konvexní na  $\Omega$  právě tehdy, když  $\mathbf{H}_f(\mathbf{x})$  je pozitivně semidefinitní pro každé  $\mathbf{x} \in \Omega$ .*

Důkaz: Vynecháváme. ■

## Příklad

- 1 Funkce  $f(x, y) = x^2 - 2xy + 4y^2$  je konvexní.
- 2 Ať  $\mathbf{Q} \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$  je symetrická a  $f(\mathbf{x}) = \mathbf{Q}\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}$ . Potom  $f$  je konvexní funkce právě tehdy, když  $\mathbf{Q}$  je pozitivně semidefinitní.

# Konvexní funkce

## Příklad

Ať  $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ ,  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ . Potom

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2$$

je konvexní funkce.

## Věta (stacionární body konvexní funkce na otevřené množině)

*Nechť  $f \in C^2(\Omega)$ , kde  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  je otevřená konvexní množina. Potom  $\mathbf{a} \in \Omega$  je bod minima funkce  $f$  (na  $\Omega$ ) právě tehdy, když  $\nabla f(\mathbf{a}) = 0$ .*

Důkaz: Viz přednáška. ■

## Příklad

Funkce

$$f(x, y) = x^4 + y^2$$

je konvexní třídy  $C^\infty$ . Má jediný bod minima, a to bod  $(0, 0)$ .

# Metoda nejmenších čtverců

Ať  $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{R})$  a  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ . Hledejme body minima funkce

$$f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2.$$

- Hledáme  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  tak, aby vzdálenost mezi  $\mathbf{Ax}$  a  $\mathbf{b}$  byla co nejmenší.
- Má-li soustava  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  řešení, pak množina jejích řešení se rovná množině všech bodů minima funkce  $f$ .
- O bodech minima funkce  $f$  se často mluví jako o **řešeních soustavy  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$  ve smyslu nejmenších čtverců**.

## Tvrzení

*Ať  $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$  a  $\mathbf{A} \in \mathbb{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ . Potom  $\mathbf{a}$  je bod minima funkce  $f(\mathbf{x}) = \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|^2$  právě tehdy, když  $\mathbf{a}$  je řešením soustavy rovnic*

$$\mathbf{A}^T \mathbf{Ax} = \mathbf{A}^T \mathbf{b}.$$

Důkaz: Viz přednáška. ■

# Metoda nejmenších čtverců

## Příklad

$$\text{Ať } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \text{ a } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \\ -3 \end{pmatrix}. \text{ Řešení soustavy } \mathbf{Ax} = \mathbf{b} \text{ ve}$$

smyslu nejmenších čtverců je  $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ .

## Příklad

Metodou nejmenších čtverců proložte body  $(-2, 0)$ ,  $(-1, 0)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(1, 2)$ ,  $(2, 5)$  graf afinní funkce  $\alpha x + \beta$ . Hledané parametry jsou  $\alpha = \frac{6}{5}$  a  $\beta = \frac{8}{5}$ .

# Vázané extrémy

Je dána funkce

$$f(x, y) = y - 2x$$

a množina

$$M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 - 1 = 0\}.$$

Jak nalézt body extrému funkce  $f$  na  $M$ ?

- Označme  $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$ .
- V bodech extrému musí být  $\nabla f$  a  $\nabla g$  rovnoběžné.

# Vázané extrémymy

## Věta (Lagrangeova věta o multiplikátorech)

Nechť  $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$  je otevřená,  $f, g_1, \dots, g_k \in C^1(\Omega)$ , kde  $k < n$ , a

$$M = \{\mathbf{x} \in \Omega \mid g_1(\mathbf{x}) = 0, \dots, g_k(\mathbf{x}) = 0\}.$$

Předpokládejme, že  $\mathbf{a} \in M$  je bod lokálního extrému  $f$  na  $M$  a vektory  $\nabla g_1(\mathbf{a}), \dots, \nabla g_k(\mathbf{a})$  tvoří lineárně nezávislou množinu. Potom existují  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$  tak, že

$$\nabla f(\mathbf{a}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{a}) = \mathbf{0}.$$

Důkaz: Vynecháváme. ■

- Čísla  $\lambda_1, \dots, \lambda_k$  z předchozí věty se nezývají **Lagrangeovy multiplikátory**.

# Vázané extrémymy

- $\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^k \lambda_i g_i(\mathbf{x}) \dots$  Lagrangeova funkce.
- Bod  $\mathbf{x} \in \Omega$  je kandidát na bod lokálního extrému  $f$  na  $M$ , existuje-li  $\boldsymbol{\lambda} \in \mathbb{R}^m$  tak, že

$$\begin{aligned}\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) &= \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_n}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = 0, \\ \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_1}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) &= \dots = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_k}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = 0.\end{aligned}$$

## Příklad

Ať  $f(x, y) = x^2 + y^2$  a  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x - 1)^2 = 0\}$ . Bod minima je zřejmě  $(1, 0)$ , ale neexistuje  $\lambda \in \mathbb{R}$  tak, že

$$\nabla f(1, 0) + \lambda \nabla g(1, 0) = (0, 0),$$

kde  $g(x, y) = (x - 1)^2$ . To však není spor s Lagrangeovou větou o multipliktátorech, neboť  $\nabla g(1, 0)$  netvoří lineárně nezávislou množinu.

# Vázané extrémymy

## Příklad

At

$$f(x, y, z) = 3x + 3y + 8z$$

a

$$M = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + z^2 = 1, y^2 + z^2 = 1\}.$$

Bod  $\frac{1}{5}(3, 3, 4)$  je bod maxima a  $-\frac{1}{5}(3, 3, 4)$  je bod minima  $f$  na  $M$ .

## Příklad

Najděte délky  $x, y, z$  hran krabice tvaru kvádrů tak, aby krabice měla co největší objem za podmínky, že obsah jejího povrchu bez víka bude  $12 \text{ dm}^2$ . Hledané délky stran jsou  $x = y = 2 \text{ dm}$  a  $z = 1 \text{ dm}$ .