

# Matematická analýza 2

## Úvod

Martin Bohata

Katedra matematiky  
FEL ČVUT v Praze  
martin.bohata@fel.cvut.cz

Stránky předmětu:

<https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B0B01MA2>

Obsah kurzu:

- 1 diferenciální počet;
- 2 integrální počet;
- 3 posloupnosti a řady funkcí.

# Euklidovský prostor

Ať  $n \in \mathbb{N}$ . Označme

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \text{ pro každé } i = 1, \dots, n\}.$$

Pro každé  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$  a  $\alpha \in \mathbb{R}$  definujeme

(O1) sčítání:  $\mathbf{x} + \mathbf{y} := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ ;

(O2) násobení číslem:  $\alpha \mathbf{x} := (\alpha x_1, \dots, \alpha x_n)$ ;

(O3) skalární součin:  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} := x_1 y_1 + \dots + x_n y_n = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ .

Definice (n-dimenzionální euklidovský prostor)

Množina  $\mathbb{R}^n$  vybavená operacemi (O1)–(O3) se nazývá (n-dimenzionální) euklidovský prostor.

# Euklidovský prostor

Terminologie a značení:

- Místo  $\mathbb{R}^1$  budeme psát  $\mathbb{R}$ .
- Prvky euklidovského prostoru nazýváme **body** nebo také **vektory**.
- Reálná čísla  $x_1, \dots, x_n$  nazýváme **složky** (případně **souřadnice** či **komponenty**) vektoru  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$
- Mezi řádkovým a sloupcovým zápisem vektorů v  $\mathbb{R}^n$  nebudeme dělat rozdíl. Sloupcový však budeme využívat jen při zápisech s maticovým násobením.

Definice (euklidovská norma)

**Euklidovská norma** (případně **velikost**) vektoru  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  je číslo

$$\|\mathbf{x}\| := \sqrt{\mathbf{x} \cdot \mathbf{x}} = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

# Vlastnosti euklidovské normy

- $\forall \mathbb{R}$  je  $\|x\| = |x|$ .

## Tvrzení (základní vlastnosti)


Pro každé  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  a každé  $\alpha \in \mathbb{R}$  platí

- 1  $\|\mathbf{x}\| \geq 0$  a navíc  $\|\mathbf{x}\| = 0$  právě tehdy, když  $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ;
- 2  $\|\alpha\mathbf{x}\| = |\alpha| \|\mathbf{x}\|$ ;
- 3  $|\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|$ ; *(Cauchyho-Schwarzova nerovnost)*
- 4  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ ; *(Trojúhelníková nerovnost)*

Důkaz: Viz přednáška. ■

# Vzdálenost dvou bodů

Vzdálenost mezi body  $x, y \in \mathbb{R}^n$  je  $\|x - y\|$ .



Vlastosti vzdálenosti dvou bodů:

- 1  $\|x - y\| \geq 0$  a navíc  $\|x - y\| = 0$  právě tehdy, když  $x = y$ ;
- 2  $\|x - y\| = \|y - x\|$ ;
- 3  $\|x - z\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ .

# Úhel mezi vektory

**Úhel** mezi nenulovými vektory  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  je číslo  $\varphi \in [0, \pi]$  splňující

$$\cos \varphi = \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}.$$

- Díky Cauchyho-Schwarzově nerovnosti je úhel dobře definovaný.
- Pomocí skalárního součinu má smysl definovat kolmost dvou vektorů i v případě, kdy některý z vektorů je nulový.

## Definice (kolmost vektorů)

Řekneme, že dva vektory  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  jsou na sebe **kolmé** (píšeme  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ ), jestliže  $\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = 0$ .


- $\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2$  právě tehdy, když  $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$ .

## Příklad


Ať  $\mathbf{x} = (3, 4)$  a  $\mathbf{y} = (-1, 7)$ . Potom  $\|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = 5$ . Úhel mezi vektory  $\mathbf{x}$  a  $\mathbf{y}$  je  $\varphi = \frac{\pi}{4}$ . Dále  $\mathbf{x} \perp \mathbf{v}$  právě tehdy, když  $\mathbf{v} = t(-4, 3)$ , kde  $t \in \mathbb{R}$ .

## Další normy na $\mathbb{R}^n$


- **Součtová norma:**  $\|\mathbf{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$ .
- **Maximová norma:**  $\|\mathbf{x}\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$ .
- **Není těžké ukázat, že se jedná o normy na lineárním prostoru  $\mathbb{R}^n$ .**



$$\|\mathbf{x}\|_1 < \varepsilon$$



$$\|\mathbf{x}\| < \varepsilon$$



$$\|\mathbf{x}\|_\infty < \varepsilon$$

### Tvrzení (nerovnosti mezi normami)

Pro každé  $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$  platí

- 1  $|x_i| \leq \|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\| \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|_\infty$  pro každé  $i = 1, \dots, n$ ;
- 2  $\|\mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{x}\|_1 \leq \sqrt{n} \|\mathbf{x}\|$ .

Důkaz: Viz přednáška. ■



# Posloupnost v $\mathbb{R}^n$ a její limita

- **Posloupnost (bodů) v  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  ...  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$** , kde  $\mathbf{x}_k \in M$  pro každé  $k \in \mathbb{N}$ .
- Pro všechny posloupnosti  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$ ,  $(\mathbf{y}_k)_{k=1}^{+\infty}$  v  $\mathbb{R}^n$  a pro každé  $\alpha \in \mathbb{R}$  definujeme

$$(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty} + (\mathbf{y}_k)_{k=1}^{+\infty} := (\mathbf{x}_k + \mathbf{y}_k)_{k=1}^{+\infty},$$

$$\alpha (\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty} := (\alpha \mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}.$$

## Definice (limita posloupnosti)

Nechť  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  je posloupnost bodů v  $\mathbb{R}^n$  a  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $\mathbf{x}$  je **limita posloupnosti  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$**  (případně  **$(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  konverguje k  $\mathbf{x}$** ) a píšeme

$\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}$  (nebo  $\mathbf{x}_k \rightarrow \mathbf{x}$  pro  $k \rightarrow +\infty$ ), jestliže

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \|\mathbf{x}_k - \mathbf{x}\| = 0.$$

# Limita posloupnosti

Terminologie:

- $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  je **konvergentní posloupnost** ...  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  konverguje k nějakému  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ .
- $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  je **divergentní posloupnost** ...  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  není konvergentní.

Tvrzení (jednoznačnost limity posloupnosti)

*Každá posloupnost bodů v  $\mathbb{R}^n$  má nejvýše jednu limitu.*

Důkaz: Viz přednáška. ■

Tvrzení (konvergence posloupnosti po složkách)

*Nechť  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  je posloupnost bodů v  $\mathbb{R}^n$ ,  $\mathbf{x}_k = (x_{k1}, \dots, x_{kn})$  a  $\mathbf{L} = (L_1, \dots, L_n) \in \mathbb{R}^n$ . Pak  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{L}$  právě tehdy, když*

*$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_{kj} = L_j$  pro každé  $j = 1, \dots, n$ .*

Důkaz: Viz přednáška. ■

# Limita posloupnosti

## Příklad

- 1 Posloupnost  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$ , kde  $\mathbf{x}_k = (1, (-1)^k)$ , je divergentní.
- 2 Posloupnost  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$ , kde  $\mathbf{x}_k = \left(\frac{2k+1}{1-k}, \sqrt[k]{k}\right)$ , je konvergentní a  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_k = (-2, 1)$ .

## Tvrzení (základní pravidla o limitách posloupností)

Je-li  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_k = \mathbf{x}$ ,  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{y}_k = \mathbf{y}$  a  $\alpha \in \mathbb{R}$ , potom

- 1  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \alpha \mathbf{x}_k = \alpha \mathbf{x}$ ;
- 2  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_k + \mathbf{y}_k = \mathbf{x} + \mathbf{y}$ ;
- 3  $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{x}_k \cdot \mathbf{y}_k = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$ .

Důkaz: Viz přednáška. ■

# Omezené posloupnosti

## Definice (omezená posloupnost)

Posloupnost  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  v  $\mathbb{R}^n$  se nazve **omezená**, jestliže existuje  $R > 0$  tak, že  $\|\mathbf{x}_k\| \leq R$  pro každé  $k \in \mathbb{N}$ .

## Příklad

- 1 Posloupnost  $((1, k))_{k=1}^{+\infty}$  není omezená.
  - 2 Posloupnost  $((\frac{1}{k}, (-1)^k))_{k=1}^{+\infty}$  je omezená.
- Každá konvergentní posloupnost je nutně omezená.
  - Ne každá omezená posloupnost je konvergentní (viz příklad výše).
  - Všimněme si, že z posloupnosti  $((\frac{1}{k}, (-1)^k))_{k=1}^{+\infty}$  můžeme vynecháním vhodných členů vytvořit konvergentní posloupnost. Je to náhoda?

# Podposloupnosti

## Definice (podposloupnost)

**Podposloupnost** posloupnosti  $(\mathbf{x}_k)_{k=1}^{+\infty}$  v  $\mathbb{R}^n$  je posloupnost  $(\mathbf{x}_{k_l})_{l=1}^{+\infty}$ , kde  $(k_l)_{l=1}^{+\infty}$  je rostoucí posloupnost přirozených čísel. Místo  $(\mathbf{x}_{k_l})_{l=1}^{+\infty}$  budeme také psát  $(\mathbf{x}_{k(l)})_{l=1}^{+\infty}$ .

## Příklad

Podposloupnosti posloupnosti  $\left(\left(\frac{1}{k}, (-1)^k\right)\right)_{k=1}^{+\infty}$  jsou například

- 1  $\left(\left(\frac{1}{l+1}, (-1)^{l+1}\right)\right)_{l=1}^{+\infty}$ ;
- 2  $\left(\left(\frac{1}{2l}, 1\right)\right)_{l=1}^{+\infty}$ ;
- 3  $\left(\left(\frac{1}{2l+1}, -1\right)\right)_{l=1}^{+\infty}$ .

# Podposloupnosti

## Tvrzení (konvergence podposloupností)

*Konverguje-li posloupnost  $(x_k)_{k=1}^{+\infty}$  bodů v  $\mathbb{R}^n$  k  $x$ , pak k bodu  $x$  konverguje také každá její podposloupnost.*

Důkaz: Viz přednáška. ■

## Věta (Bolzanova-Weierstrassova věta)

*Každá omezená posloupnost  $(x_k)_{k=1}^{+\infty}$  bodů v  $\mathbb{R}^n$  má konvergentní podposloupnost.*

Důkaz: Viz přednáška. ■

- Předpoklad omezenosti v Bolzanově-Weierstrassově věta je podstatný. Například číselná posloupnost  $(k)_{k=1}^{+\infty}$  nemá konvergentní podposloupnost.

# Okolí bodu

## Definice (okolí a prstencové okolí bodu)

Nechť  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$  a  $\varepsilon > 0$ . Množinu

$$U(\mathbf{x}; \varepsilon) := \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \varepsilon\}$$

nazýváme **okolí bodu  $\mathbf{x}$  o poloměru  $\varepsilon$** . Množinu

$$P(\mathbf{x}; \varepsilon) := U(\mathbf{x}; \varepsilon) \setminus \{\mathbf{x}\} = \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid 0 < \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| < \varepsilon\}$$

nazýváme **prstencové okolí bodu  $\mathbf{x}$  o poloměru  $\varepsilon$** .

- Nebude-li nutné specifikovat poloměr  $\varepsilon$  okolí a prstencového okolí, budeme stručněji psát  $U(\mathbf{x})$  a  $P(\mathbf{x})$ .

# Vnitřek, hranice a uzávěr množiny

## Definice (vnitřek, hranice a uzávěr množiny)

Nechť  $M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $x \in \mathbb{R}^n$  je

- 1 **vnitřní bod** množiny  $M$ , jestliže existuje  $U(x)$  tak, že  $U(x) \subseteq M$ ;
- 2 **hraniční bod** množiny  $M$ , jestliže pro každé  $U(x)$  platí  $U(x) \cap M \neq \emptyset$  a současně  $U(x) \cap (\mathbb{R}^n \setminus M) \neq \emptyset$ .

**Vnitřek**  $\text{int}(M)$  množiny  $M$  je množina všech vnitřních bodů množiny  $M$ .

**Hranice**  $\partial M$  množiny  $M$  je množina všech hraničních bodů množiny  $M$ .

**Uzávěr**  $\overline{M}$  množiny  $M$  je množina  $M \cup \partial M$ .



## Příklad

Ať  $M = [0, 1) \subseteq \mathbb{R}$ . Potom

$$\text{int}(M) = (0, 1),$$

$$\partial M = \{0, 1\},$$

$$\overline{M} = [0, 1].$$

## Příklad

Ať  $M = [0, 1) \times \{0\} \subseteq \mathbb{R}^2$ . Potom

$$\text{int}(M) = \emptyset,$$

$$\partial M = \overline{M} = [0, 1] \times \{0\}.$$

# Otevřené a uzavřené množiny

## Definice (otevřená a uzavřená množina)

Nechť  $M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že množina  $M$  je **otevřená**, jestliže  $M = \text{int}(M)$ . Množina  $M$  se nazve **uzavřená**, jestliže  $M = \overline{M}$ .

## Příklad

- 1 Prázdná množina a  $\mathbb{R}^n$  jsou množiny otevřené a současně uzavřené v  $\mathbb{R}^n$ .
- 2 Interval  $[0, 1)$  není otevřená ani uzavřená množina.
- 3 Každé okolí bodu v  $\mathbb{R}^n$  je otevřená množina.
- 4 Množina

$$B(\mathbf{x}; r) := \{\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| \leq r\},$$

která se nazývá  **$n$ -dimenzionální koule** se středem  $\mathbf{x}$  a poloměrem  $r$ , je uzavřená.

# Otevřené a uzavřené množiny

## Tvrzení (charakterizace uzavřené množiny)

*Nechť  $M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Následující tvrzení jsou ekvivalentní:*

- 1  $M$  je uzavřená množina v  $\mathbb{R}^n$ .
- 2  $\mathbb{R}^n \setminus M$  je otevřená množina v  $\mathbb{R}^n$ .
- 3 Každá konvergentní posloupnost bodů v  $M$  má limitu ležící v  $M$ .

Důkaz: Viz přednáška. ■

Lze ukázat, že:

- Libovolné sjednocení a konečný průnik otevřených množin jsou otevřené množiny.
- Konečné sjednocení a libovolný průnik uzavřených množin jsou uzavřené množiny.
- $\overline{M}$  je průnik všech uzavřených množin obsahujících  $M$ .
- $\text{int}(M)$  je sjednocení všech otevřených podmnožin množiny  $M$ .

# Hromadné a izolované body

## Definice (hromadný a izolovaný bod)

Nechť  $M \subseteq \mathbb{R}^n$ . Řekneme, že  $x \in \mathbb{R}^n$  je

- 1 **hromadný bod** množiny  $M$ , jestliže existuje posloupnost  $(x_k)_{k=1}^{+\infty}$  bodů v  $M \setminus \{x\}$  konvergující k  $x$ .
- 2 **izolovaný bod** množiny  $M$ , jestliže  $x \in M$  a  $x$  není hromadný bod  $M$ .

## Příklad

- 1 Konečná množina nemá hromadné body, má jen izolované.
- 2 Každý vnitřní bod množiny je jejím hromadným bodem.
- 3 Množina  $\{\frac{1}{k} \mid k \in \mathbb{N}\}$  má jediný hromadný bod, a to 0.
- 4 Ať  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x^2 + y^2)(x^2 + y^2 - 1) = 0\}$ . Hromadné body množiny  $M$  jsou body na jednotkové kružnici se středem v počátku. Množina  $M$  má jediný izolovaný bod, a to počátek.

# Hromadné a izolované body

## Příklad (pokračování)

- ⑤ Jediné hromadné body množiny  $M = \left\{ \left( \sqrt[k]{k}, \cos \left( k \frac{\pi}{2} \right) \right) \mid k \in \mathbb{N} \right\}$  jsou  $(1, -1)$ ,  $(1, 0)$  a  $(1, 1)$ .

## Tvrzení (charakterizace hromadných a izolovaných bodů)

At'  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  a  $x \in \mathbb{R}^n$ .

- ① Bod  $x$  je hromadný bod množiny  $M$  právě tehdy, když pro každé  $P(x)$  je  $P(x) \cap M \neq \emptyset$ ;
- ② Bod  $x$  je izolovaný bod množiny  $M$  právě tehdy, když existuje  $U(x)$  tak, že  $U(x) \cap M = \{x\}$ .

Důkaz: Vynecháváme. ■

# Hromadné a izolované body

- Hromadný bod může existovat, jen když je množina nekonečná.
- Ne každá nekonečná množina však má hromadný bod.

## Definice (omezená množina)

Množina  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  se nazve **omezená**, jestliže existuje reálné číslo  $R > 0$  tak, že  $\|x\| \leq R$  pro každé  $x \in M$ .

## Tvrzení (existence hromadného bodů)

*Každá nekonečná omezená množina  $M \subseteq \mathbb{R}^n$  má hromadný bod.*

Důkaz: Viz přednáška. ■