

# Křivkový integrál

## Zadání

- Nalezněte parametrizaci křivky, která vznikne
  - průnikem ploch  $z = x^2$ ,  $x + y + z = 1$  a poloprostoru  $z \leq 1$ ;
  - průnikem válce  $x^2 + y^2 = 16$  a roviny  $z = x + y$ .
- Vypočtěte délku křivky  $C$ , jestliže
  - $C$  má parametrizaci  $\varphi(t) = (t^2, 9t, 4t^{\frac{3}{2}})$ ,  $t \in [1, 4]$ ;
  - $C$  je asteroida  $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$  (parametrizace asteroidy je  $\varphi(t) = (\cos^3 t, \sin^3 t)$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ );
  - $C$  je graf funkce  $f(x) = \frac{x^3}{6} + \frac{1}{2x}$ ,  $x \in [\frac{1}{2}, 2]$ .
- Vypočtěte křivkový integrál z funkce  $f$  podél křivky  $C$ , jestliže
  - $f(x, y) = xy^4$ ,  $C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0, x^2 + y^2 = 2\}$ ;
  - $f(x, y, z) = xe^{yz}$ ,  $C$  je úsečka s krajními body  $(0, 0, 0)$  a  $(1, 2, 3)$ ;
  - $f(x, y, z) = x - y + 2z$ ,  $C$  je spojení úsečky s krajními body  $(0, 0, 0)$  a  $(1, 1, 0)$  a úsečky s krajními body  $(1, 1, 0)$  a  $(1, 1, 1)$ ;
  - $f(x, y) = xy$ , kde  $C$  je část elipsy  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ , kde  $a, b > 0$ , která leží v prvním kvadrantu.
- Vypočtěte křivkový integrál z vektorového pole  $\mathbf{F}$  podél orientované křivky  $C$ , jestliže
  - $\mathbf{F}(x, y) = (x^2, 4y)$ ,  $C$  má parametrizaci  $\varphi(t) = (e^t, t^2)$ ,  $t \in [0, 2]$ ;
  - $\mathbf{F}(x, y) = (e^x, 0)$ ,  $C$  je část křivky  $x = y^3$ , počáteční bod je  $(-1, -1)$  a koncový bod je  $(1, 1)$ ;
  - $\mathbf{F}(x, y) = (-y, -x)$ ,  $C$  je horní půlkružnice o středu  $(0, 0)$  a poloměru 2, počáteční bod je  $(2, 0)$  a koncový bod je  $(-2, 0)$ ;
  - $\mathbf{F}(x, y, z) = (z^2, x^2, y^2)$ ,  $C$  je úsečka s počátečním bodem  $(1, 0, 0)$  a koncovým bodem  $(4, 1, 2)$ .
- Určete hmotnost pružiny, jejíž parametrizace je  $\varphi(t) = (2 \cos t, 2 \sin t, t)$ ,  $t \in [0, 4\pi]$ , jestliže její lineární hustota hmotnosti je  $\rho(x, y, z) = z$ .
- Uzavřená křivka  $C \subseteq \mathbb{R}^3$  je dána rovnicemi  $x^2 + y^2 = 4$  a  $z = 0$ . Jakou práci vykoná silové pole  $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, xy, 1)$  na částici, která (jednou) oběhne  $C$  tak, že prochází body  $(2, 0, 0)$ ,  $(0, 2, 0)$  a  $(-2, 0, 0)$  v uvedeném pořadí.
- Nalezněte všechny hodnoty parametru  $\alpha \in \mathbb{R}$  takové, aby vektorové pole  $\mathbf{F}(x, y) = (\alpha xy + y^2, x^2 + 2xy)$  bylo potenciální.

8. Nalezněte funkci  $g(x)$  tak, aby vektorové pole

$$\mathbf{F}(x, y) = (y \sin x + xy \cos x + e^y, g(x) + xe^y)$$

bylo potenciální a  $g(0) = 0$ .

9. Je dáno vektorové pole  $\mathbf{F}(x, y) = (3 + 2xy^2, 2x^2y)$ .

(a) Rozhodněte, zda  $\mathbf{F}$  je potenciální. Pokud ano, pak nalezněte potenciál  $f$  vektorového pole  $\mathbf{F}$  splňující  $f(0, 0) = 0$ .

(b) Vypočtěte křivkový integrál vektorového pole  $\mathbf{F}$  podél křivky  $C$ , která je částí hyperboly  $y = \frac{1}{x}$  s počátečním bodem  $(1, 1)$  a koncovým bodem  $(4, \frac{1}{4})$ .

10. Je dáno vektorové pole  $\mathbf{F}(x, y, z) = (2 - xy + z, x - z - 3, x^2 - y)$ .

(a) Rozhodněte, zda  $\mathbf{F}$  je potenciální. Pokud ano, pak nalezněte potenciál  $f$  vektorového pole  $\mathbf{F}$  splňující  $f(0, 0, 0) = 0$ .

(b) Vypočtěte křivkový integrál vektorového pole  $\mathbf{F}$  podél úsečky  $C$  s počátečním bodem  $(1, 0, -2)$  a koncovým bodem  $(4, 6, 3)$ .

11. Je dáno vektorové pole  $\mathbf{F}(x, y, z) = (\sin y, x \cos y + \cos z, -y \sin z)$ .

(a) Rozhodněte, zda  $\mathbf{F}$  je potenciální. Pokud ano, pak nalezněte potenciál  $f$  vektorového pole  $\mathbf{F}$  splňující  $f(1, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) = 3$ .

(b) Vypočtěte křivkový integrál vektorového pole  $\mathbf{F}$  podél křivky  $C$  s parametrizací  $\varphi(t) = (\sin t, t, 2t)$ ,  $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ .

12. Pomocí Greenovy věty vypočtěte křivkový integrál z vektorového pole  $\mathbf{F}$  podél orientované křivky  $C$ , jestliže

(a)  $\mathbf{F}(x, y) = (ye^x, 2e^x)$  a  $C$  je kladně orientovaná hranice obdélníka s vrcholy  $(0, 0)$ ,  $(3, 0)$ ,  $(3, 4)$ ,  $(0, 4)$ ;

(b)  $\mathbf{F}(x, y) = (y^3, -x^3)$  a  $C$  je kladně orientovaná kružnice  $x^2 + y^2 = 4$ ;

(c)  $\mathbf{F}(x, y) = (e^{-x} + y^2, e^{-y} + x^2)$  a  $C$  je záporně orientovaná hranice množiny

$$M = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq y \leq \cos x, x \in \left[ -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \right\}.$$

13. Pomocí Greenovy věty vypočtěte obsah množiny  $M$ , jestliže

(a)  $M$  je ohraničená křivkami  $y = 5x - 3$ ,  $y = x^2 + 1$ ;

(b)  $M$  je ohraničená osou  $x$  a křivkou s parametrizací

$$\varphi(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t), \quad t \in [0, 2\pi].$$

## Výsledky

1. (a)  $\varphi(t) = (t, 1 - t - t^2, t^2)$ ,  $t \in [-1, 1]$ ;  
(b)  $\varphi(t) = (4 \cos t, 4 \sin t, 4(\cos t + \sin t))$ ,  $t \in [0, 2\pi]$ .
2. (a) 42;  
(b) 6;  
(c)  $\frac{33}{16}$ .
3. (a)  $\frac{16}{5}$ ;  
(b)  $\frac{\sqrt{14}}{12}(e^6 - 1)$ ;  
(c) 1;  
(d)  $\frac{ab}{3(a+b)}(a^2 + ab + b^2)$ .
4. (a)  $\frac{e^6 - 1}{3} + 32$ ;  
(b)  $\frac{e^2 - 1}{e}$ ;  
(c) 0;  
(d)  $\frac{35}{3}$ .
5.  $8\sqrt{5}\pi^2$ .
6. 0.
7.  $\alpha = 2$ .
8.  $g(x) = x \sin x$ .
9. (a)  $3x + x^2y^2$ .  
(b) 9.
10. (a)  $\mathbf{F}$  není potenciální.  
(b)  $-\frac{11}{2}$ .
11. (a)  $f(x, y, z) = x \sin y + y \cos z + 2$ .  
(b)  $1 - \frac{\pi}{2}$ .
12. (a)  $4(e^3 - 1)$ ;  
(b)  $-24\pi$ ;  
(c)  $\frac{\pi}{2}$ .
13. (a)  $\frac{9}{2}$ ;  
(b)  $3\pi$ .